



**【EC療法について】**  
(エピルビシン+エンドキサン)



様



コース目



**お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
アプレピタントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服															
パロノセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	30分		1日2錠													
デカドロン錠	吐き気止めです	1日1回内服															
エピルビシン注	抗がん剤です	5分		尿の色が赤くなることがあります。													
エンドキサン注	抗がん剤です	30分															

この週はお休みです。



**治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																
	口内炎																
	色素沈着																
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																
検査値	白血球減少																
	赤血球減少(貧血)																
	血小板減少																

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。