



【CPT-11+アービタックス療法について】 (トポテシン+アービタックス)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			パロノセトロン注 デキサート注 ポララミン注	吐き気止めとアレルギー様症状を抑える薬です	15分	☺														☺												
デキサート注 ポララミン注	アレルギー様症状を抑える薬です	15分								☺															☺							☺
アービタックス注	抗がん剤です	2時間	☺							☺							☺								☺							☺
トポテシン注	抗がん剤です	2時間	☺														☺															☺

2回目から投与時間が短くなる場合があります。

*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

自覚症状	検査値	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
		アレルギー様症状									☺																					
食欲不振・吐き気																																
口内炎																																
下痢																																
色素沈着																																
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																
皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																																
白血球減少																																
赤血球減少(貧血)																																
血小板減少																																



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

