



【FOLFOXIRI+BEV療法について】

(アバステン+5-FU+レボホリナート+エルプラット+トポテシン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
アプレタトカプセル	吐き気止めです	1日1回																																
パロノセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	15分																																
アバステン注	抗がん剤です	90分		2回目から点滴時間が短くなる場合があります。																														
トポテシン注	抗がん剤です	1時間		この週はお休みです。																														
エルプラット注	抗がん剤です	2時間		この週はお休みです。																														
レボホリナート注	5-FUの効果を高める薬です	2時間																																
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間																																

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
自覚症状																																	
過敏症																																	
食欲不振・吐き気																																	
口内炎																																	
下痢																																	
手足のしびれ																																	
色素沈着																																	
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																	
検査値																																	
白血球減少																																	
赤血球減少(貧血)																																	
血小板減少																																	

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

