



# 【トポテシン+S-1+ベクティビックス療法について】





様

□ コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			パロノセトロン注	吐き気止めです	15分	💧														💧												
デキサート注	吐き気止めです	15分	💧															💧														💧
ベクティビックス注	抗がん剤です	1時間	💧															💧														💧
トポテシン注	抗がん剤です	90分	💧															💧														💧
S-1錠	抗がん剤です	朝・夕 内服		🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯														🍯



## 😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
自覚症状	食欲不振・吐き気																															
	口内炎																															
	下痢																															
	色素沈着																															
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																															
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																															
検査値	白血球減少																															
	赤血球減少(貧血)																															
	血小板減少																															



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。