



【FOLFIRI+ベクティビックス療法について】

(5-FU+レボホリナート+トポテシン+ベクティビックス)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			パロノセトロン注	吐き気止めです	15分	☺														☺												
デキサート注			☺																													☺
ベクティビックス注	抗がん剤です	1時間	☺																													☺
トポテシン注	抗がん剤です	2時間	☺																													☺
レボホリナート注	5-FUの効果を強める薬です	2時間	☺																													☺
5-FU注	抗がん剤です	約5分	☺																													☺
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	↔☺↔																													↔☺↔

この週はお休みです。

この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																														
	口内炎																														
	下痢																														
	色素沈着																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																														
検査値	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。