



【FOLFIRI+アバスチン療法について】 (5-FU+レボホリナート+トポテシン+アバスチン)



様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			パロノセトロン注	吐き気止めです	15分	🧪														🧪												
アバスチン注	抗がん剤です	90分	🧪															🧪														🧪
トポテシン注	抗がん剤です	2時間	🧪															🧪													🧪	
レボホリナート注	5-FUの効果を強める薬です		🧪															🧪													🧪	
5-FU注	抗がん剤です	約5分	🧪															🧪													🧪	
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	←🧪→															←🧪→													←	

🧠 この週はお休みです。

🗨️ 2回目から点滴時間が短くなる場合があります。

🧠 この週はお休みです。

😊 治療による副作用

📌 : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気	📌	📌	📌													📌	📌	📌												📌
	口内炎				📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌
	下痢				📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌
	色素沈着																	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌
検査値	白血球減少																	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌
	赤血球減少(貧血)																	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌
	血小板減少																	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌	📌

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。