




【mFOLFOX6療法について】
(5-FU+レボホリナート+エルプラット)



様

コース目

😊 お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
パロノセトロン注	吐き気止めです	15分	点滴													点滴													点滴		
デキサート注																															
エルプラット注	抗がん剤です		点滴														点滴												点滴		
レボホリナート注	5-FUの効果を高める薬です	2時間	点滴															点滴											点滴		
5-FU注	抗がん剤です	約5分	点滴														点滴												点滴		
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴		

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

自覚症状	過敏症	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
	過敏症	■														■														
	食欲不振・吐き気	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	口内炎		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	手足のしびれ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	白血球減少																													
	赤血球減少(貧血)																													
	血小板減少																													
	肝機能低下																													

- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

