



# 【ACT-D療法について】 (コスメゲン)





様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			パロノセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	30分																											
デキサート注	吐き気止めです	30分																														
コスメゲン注	抗がん剤です	5分																														



## ☺ 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
自覚症状	食欲不振・吐き気																																
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																																
	神経過敏・手足のしびれ																																
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																																
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																
髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																																	
検査値	口内炎																																
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																																
	色素沈着																																
	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																																
検査値	白血球減少																																
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																																
	赤血球減少(貧血)																																
	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																																
検査値	血小板減少																																
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																																
検査値	肝機能低下																																
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																																



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。