



【ゲムシタビン+ペバシズマブ療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの 時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			デキサート注	吐き気止めです	30分	💧							💧							💧												
ゲムシタビン注	抗がん剤です	30分	💧							💧							💧															💧
ペバシズマブ注	抗がん剤です	90分	💧																													💧

2回目から投与時間が短くなります。

この週はお休みです。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気	■	■	■					■	■	■					■	■	■													■
	血管痛・静脈炎	■	■	■					■	■	■					■	■	■													■
	下痢	■							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
検査値	白血球減少														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	赤血球減少(貧血)														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	血小板減少														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

😊 * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。