



【パクリタキセル+アクプラ療法について】





様

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
ボラフィン注 ファモチジン注 デキサート注	過敏症を抑えるお薬です	30分	☺																						☺
グラニセトロン注	吐き気止めです																								
パクリタキセル注	抗がん剤です	3時間	☺																						☺
アクプラ注	抗がん剤です	1時間	☺																						☺



* 閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください

☺ 治療による副作用

注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
自覚症状																								
過敏症																								
食欲不振・吐き気																								
筋肉痛・関節痛																								
口内炎																								
手足のしびれ																								
便秘																								
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
検査値																								
白血球減少																								
赤血球減少(貧血)																								
血小板減少																								
肝機能低下																								



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。