



【パクリタキセル＋ネダプラチン＋ベバシズマブ療法について】




様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26
ポララミン注	過敏症を抑えるお薬です	30分	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
ガスター注			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
デキサート注	吐き気止めです	3時間																						
パクリタキセル注	抗がん剤です	1時間																						
ネダプラチン注	抗がん剤です	90分																						
ベバシズマブ注	抗がん剤です																							



2回目から投与時間が短くなる場合があります。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

自覚症状	検査値	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	
過敏症																								
食欲不振・吐き気																								
筋肉痛・関節痛																								
口内炎																								
手足のしびれ																								
便秘																								
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
白血球減少																								
赤血球減少(貧血)																								
血小板減少																								
肝機能低下																								

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。