



【CHOP療法について】

(エンドキサン+ドキシソルビシン+オンコビン+プレドニゾン)



様

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
グラニセトン注	吐き気止めです	30分	📄																						📄
ドキシソルビシン注	抗がん剤です	数分	📄																						📄
オンコビン注	抗がん剤です	数分	📄																						📄
エンドキサン注	抗がん剤です	1.5時間	📄																						📄
プレドニゾン錠	ステロイドです	内服	📄	📄	📄	📄	📄																		📄

尿が赤くなることがあります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗いうがいを心がけましょう。

☺ 治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	不眠																							
	胃部不快感																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	便秘																							
	発熱																							
	手足のしびれ																							
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。