



**【R-CVP療法について】**  
 (リツキサン+エンドキサン+オンコビン+プレドニン)





様

コース目

**お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
レスタミン錠 カロナール錠	アレルギー予防です	1日1回 内服																						
リツキサン注	抗がん剤です	3~5時間																						
グラニセトロン注	吐き気止めです	30分																						
オンコビン注	抗がん剤です	数分																						
エンドキサン注	抗がん剤です	30分																						
プレドニン錠	ステロイドです	朝・昼 内服																						



**治療による副作用**

      : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状																							
	食欲不振・吐き気																							
	不眠																							
	胃部不快感																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	便秘																							
	発熱																							
	手足のしびれ																							
検査値	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																							
	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使用することもあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。