



【シスプラチン+ペトレキセド+アバスチン療法について】



様

□

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			めやすの時間		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
パンプタン	葉酸です	1日1回 内服	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
アプレピタムカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服	📄	📄	📄																					📄
パロノセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	15~30分	💉																							💉
アバスチン注	抗がん剤です	90分	💉																							💉
ペトレキセド注	抗がん剤です	10分	💉																							💉
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	💉																							💉

※ ペトレキセド注による副作用軽減のため、パンプタン末(葉酸の粉薬)の内服、メチコバル(ビタミンB12)の注射を行います。

★ 治療日は、点滴開始～シスプラチン投与終了までに1000mL以上の水分をとりましょう。
治療翌日、翌々日は食事など通常の摂取量に加えて、1日あたり1000mL程度の水分を追加摂取しましょう。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
自覚症状	食欲不振・吐き気																								
	便秘																								
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
	皮疹																								
検査値	白血球減少																								
	赤血球減少(貧血)																								
	血小板減少																								
	腎機能低下																								
	肝機能低下																								

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。