【FOLFIRINOX療法について】

(5-FU＋レボホリナート＋トポテシン＋エルプラット)

＿＿＿＿＿＿＿＿様　　□コース目

お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ	吐き気止めです	1日1回	💊	💊	💊												💊	💊	💊												
パロノセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	15分	💉														💉														💉
エルプラット注	抗がん剤です	2時間	💉														💉														💉
トポテシン注	抗がん剤です	2時間	💉														💉														💉
レボホリナート注	5-FUの効果を高める薬です	2時間	💉														💉														💉
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	←→														←→														←

この週は
お休みです。

この週は
お休みです。

治療による副作用

■:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	過敏症	■														■														■
		痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																												
	食欲不振・吐き気	■	■	■	■											■	■	■	■											■
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
	口内炎		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																												
	下痢	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■
		便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																												
	手足のしびれ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。冷たい物に触れないようにしましょう。																												
	色素沈着														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																												
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																												
検査値	白血球減少										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												

＊注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
＊上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
＊それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
＊何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

広島市民病院薬剤部