



# 【サイラムザ+パクリタキセル療法について】



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			ポラミン注 ファモチジン注 デキサート注	過敏症を抑えるお薬です	30分	💧							💧								💧												
サイラムザ注	抗がん剤です	60分	💧															💧															💧
パクリタキセル注	抗がん剤です	60分	💧								💧							💧															💧

デキサート注には、吐き気止めとしての作用もあります。

2回目から点滴時間が短くなる場合があります。

この週はお休みです。

\*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください。

## 😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
自覚症状	アレルギー様症状																																
	食欲不振・吐き気																																
	関節痛・筋肉痛																																
	手足のしびれ																																
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																
検査値	白血球減少																																
	赤血球減少(貧血)																																
	血小板減少																																
	肝機能低下																																

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。

\* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

\* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

\* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。