



【ダトロウェイ療法について】



様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

めやすの 薬の名前 作用 時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
カロナール錠	アレルギー予防	1日1回 内服																							
グラニセトン注 デキサート注 ボラミン注	吐き気止めです アレルギーを予防する薬です	30分																							
ダトロウェイ注	抗がん剤です	90分																							

2回目から投与時間が短くなることがあります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください。

😊 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
過敏症	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																							
	食欲不振・吐き気																							
	下痢																							
	口内炎																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							

間質性肺炎、血栓塞栓症

角膜障害 眼がゴロゴロする、痛い、見えづらい、乾燥する、充血する、涙の量が増える、いつもよりまぶしく感じるなどの症状があらわれる場合があります。
 点眼薬をご自身で薬局またはドラッグストアで購入し、毎日6回程度点眼してください。点眼薬は粘性を高める成分(ヒアルロン酸ナトリウムなど)や防腐剤(ベンザルコニウム塩化物など)が入っていないものを使用してください(ソフトサンティア、なみだロートファイブなど)。
 原則、コンタクトレンズの使用は避けてください。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。
- * 自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。

広島市民病院薬剤部