



【FEC療法について】 (5-FU+エピルビシン+エンドキサン)



様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目					
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服				1日目は、抗がん剤の投与開始 60~90分前 に飲んでください。																							
アロキシ注 デキサート注	吐き気止めです	15分			この週は お休みです。																								
デカドロン錠	吐き気止めです	1日1回内服																											この週は お休みです。
エピルビシン注	抗がん剤です	5分		尿の色が赤くなることがあります。																									
エンドキサン注	抗がん剤です	30分																								この週は お休みです。			
5-FU注	抗がん剤です	10分			この週は お休みです。																								

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	色素沈着																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。