



【EC療法について】
(エピルビシン+エンドキサン)



様



コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
			イメドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服												
アロキシ注 デキサート注	吐き気止めです	30分															
デカドロン錠	吐き気止めです	1日1回内服															
エピルビシン注	抗がん剤です	5分															
エンドキサン注	抗がん剤です	30分															

1日目は、抗がん剤の投与開始

1日2錠

尿の色が赤くなる場合があります。

この週はお休みです。



治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																
	口内炎																
	色素沈着																
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																
検査値	白血球減少																
	赤血球減少(貧血)																
	血小板減少																

食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。

排尿時の不快感、尿に血が混ざるなどの症状があるときはお知らせください。

口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。

肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。

髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。

感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。

貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。

出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。