




【mFOLFOX6+アービタックス療法について】



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
アロキシン注	吐き気止め、アレルギーを抑える薬	15分																																
デキサート注ポララミン注	アレルギーを抑える薬です。	15分																																
アービタックス注	抗がん剤です	1時間																																
エルプラット注	抗がん剤です	2時間																																
レボホリナート注	5-FUの効果をも強める薬です																																	
5-FU注	抗がん剤です	約5分																																
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間																																

2回目から投与時間が短くなる場合があります。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
		1/0	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/28		
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	土		
自覚症状	過敏症																																
	食欲不振・吐き気																																
	手足のしびれ																																
	口内炎																																
	色素沈着																																
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																																
検査値	白血球減少																																
	赤血球減少(貧血)																																
	血小板減少																																
	肝機能低下																																



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。