




# 【FOLFIRI療法について】

## (5-FU+レボホリナート+トポテシン)



様



コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
薬の名前	作用	めやすの時間																																	
アロキシ注	吐き気止めです	15分																																	
デキサート注																																			
トポテシン注	抗がん剤です	2時間																																	
レボホリナート注	5-FUの効果を高める薬です																																		
5-FU注	抗がん剤です	約5分																																	
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間																																	

この週はお休みです。

この週はお休みです。



### 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目					
自覚症状	食欲不振・吐き気																																		
	口内炎																																		
	下痢																																		
	色素沈着																																		
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																		
検査値	白血球減少																																		
	赤血球減少(貧血)																																		
	血小板減少																																		



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。