【FOLFOXIRI＋BEV療法について】

（アバスチン＋5-FU＋レボホリナート＋エルプラット＋トポテシン）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様　　コース目

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回	💊	💊	💊												💊	💊	💊												💊
アロキシ注 デキサート注	吐き気止めです	15分	💉														💉														💉
アバスチン注	抗がん剤です	90分	💉														💉														💉
トポテシン注	抗がん剤です	1時間	💉														💉														💉
エルプラット注	抗がん剤です	2時間	💉														💉														💉
レボホリナート注	5-FUの効果を高める薬です		💉														💉														💉
5-FU注（持続）	抗がん剤です	46時間	←💉→														←💉→														💉

この週は
お休みです。

2回目から点滴時間が
短くなることがあります。

この週は
お休みです。

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	過敏症																													
	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																													
	食欲不振・吐き気																													
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																													
	口内炎																													
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																													
	下痢																													
	便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																													
	手足のしびれ																													
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。冷たい物に触れないようにしましょう。																													
	色素沈着																													
	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																													
	脱毛（頭髪・まつ毛・眉毛など）																													
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																													
検査値	白血球減少																													
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																													
	貧血の症状（めまい・ふらつき）がでたりします。転倒に注意しましょう。																													
	血小板減少																													
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																													

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

●血圧上昇　●出血（鼻血など）　●タンパク尿　●胃腸穿孔（下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など）　●傷の治りが遅い

●血栓・塞栓（足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど）

＊上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
＊それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

広島市民病院薬剤部