




【mFOLFOX6+アバスチン療法について】

(5-FU+レボホリナート+エルプラット+アバスチン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			ハロプロセトロン注 デキササート注	吐き気止めです	15分	💧														💧												
アバスチン注	抗がん剤です	90分	💧														💧															💧
エルプラット注	抗がん剤です	2時間	💧														💧															💧
レボホリナート注	5-FUの効果を強める薬です		💧															💧														💧
5-FU注	抗がん剤です	約5分	💧														💧															💧
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	↔️💧↔️														↔️💧↔️															↔️



この週はお休みです。

2回目から点滴時間が短くなる場合があります。



この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
自覚症状	過敏症																															
	食欲不振・吐き気																															
	手足のしびれ																															
	口内炎																															
	色素沈着																															
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																															
検査値	白血球減少																															
	赤血球減少(貧血)																															
	血小板減少																															
	肝機能低下																															

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。