



# 【XELOX+アバステン療法について】

(ゼロダ+エルプラット+アバステン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
パロノセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	15分	💉																					💉
アバステン注	抗がん剤です	90分	💉																					💉
エルプラット注	抗がん剤です	2時間	💉																					💉
ゼロダ錠	抗がん剤です	朝・夕 内服		💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊

2回目から点滴時間が短くなる場合があります。

1回 錠

## 😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	過敏症																							
	食欲不振・吐き気																							
	手足のしびれ																							
	血管痛																							
	口内炎																							
	下痢																							
	手足症候群																							
	色素沈着																							
検査値	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
肝機能低下																								

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ●出血(鼻血など) ●タンパク尿 ●胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ●傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
 \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
 \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
 \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。