



【ACT-D療法について】 (コスメゲン)



様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
アロキシン注 デキサート注	吐き気止めです	30分																															
デキサート注	吐き気止めです	30分																															
コスメゲン注	抗がん剤です	5分																															

この週はお休みです。

この週はお休みです。

☺ 治療による副作用

注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目					
自覚症状	食欲不振・吐き気																																	
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																																	
	神経過敏・手足のしびれ																																	
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																																	
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																	
髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																																		
口内炎																																		
口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																																		
色素沈着																																		
肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																																		
検査値	白血球減少																																	
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																																	
	赤血球減少(貧血)																																	
	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																																	
血小板減少																																		
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																																		
肝機能低下																																		
体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる可能性があります。																																		



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。