



# 【パクリタキセル+カルボプラチン+イミフィンジ療法について】

様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
アプレピタントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																						
ポララミン注 ファモチジン注 デキサート注	過敏症を抑えるお薬です	30分																						
グラニセトロン注	吐き気止めです	60分																						
イミフィンジ注	抗がん剤です																							
パクリタキセル注	抗がん剤です	3時間																						
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間																						

この週はお休みです。

この週はお休みです。

\* 閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください

## 😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	過敏症																							
	食欲不振・吐き気																							
	筋肉痛・関節痛																							
	口内炎																							
	手足のしびれ																							
	便秘																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							

\* イミフィンジ注の副作用につきましては別紙を用いてご説明します。



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。
- \* 自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。