



【テブダック療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

めやすの 時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
薬の名前	作用																								
人エマイティア	ドライアイの予防 のお薬です	1日数回 点眼																							
フルメロン点眼	炎症を抑えるお薬 です	1日3回 点眼				テブダック投与前日より 開始となります。  この週は お休みです。  この週は お休みです。																			
アイファガン点眼	血管を収縮させる お薬です	1回 1～3滴 *テブダック投与直前																							
デキサート注	吐き気止めです	15分																							
テブダック注	抗がん剤です	30分																							

*フルメロン点眼液は、テブダック投与1日前より開始し、合計4日間投与します

😊 治療による副作用

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
	眼障害	眼の充血、眼や瞼の腫れ、痛み、めやにやかゆみ、眼の乾き、見えにくなどの症状が起きることがあります。																						
	皮膚障害	皮膚が広範囲に赤みや高熱、唇や陰部のただれなどの症状が出た場合はお知らせください。																						
	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																						
	下痢	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出る時はお知らせ下さい。																						
	手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍などの症状が出る場合があります。																						
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																						
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがい心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																						
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																						
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																						
	肝機能低下	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																						

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

●出血(鼻血など) ●腸炎・腸閉塞



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 抗がん剤投与および投与後一定期間は適切な避妊を行ってください。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

広島市民病院薬剤部