



# 【ABVD療法について】

## (ドキソルピシン+プレオ+エクザール+ダカルバジン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
グラニセトン注	吐き気止めです	30分																																				
プレオ注	抗がん剤です	15分																																				
エクザール注	抗がん剤です	15分																																				
ドキソルピシン注	抗がん剤です	15分																																				
ダカルバジン注	抗がん剤です	2時間																																				

尿が赤くなる場合があります。

光によって分解し、血管痛の原因になることがあるので、遮光して点滴します。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

### 😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目								
自覚症状	発熱																																					
	血管痛																																					
	食欲不振・吐き気																																					
	口内炎																																					
	便秘																																					
	色素沈着																																					
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																					
検査値	白血球減少																																					
	赤血球減少(貧血)																																					
	血小板減少																																					
	肝機能低下																																					

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

肺の症状(治療開始から2~6ヶ月ほどで起こることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。