



【G-CHOP療法について】 (ガザイバ+エンドキサン+ドキソルビシン+オンコピン+プレドニゾン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
レスタミン錠	アレルギー様症状を抑える	1日1回 内服	☯																					☯
ガザイバ注	抗がん剤です	3~6時間	💉																					💉
グラニセトン注	吐き気止めです	30分	💉																					💉
ドキソルビシン注	抗がん剤です	数分	💉																					💉
オンコピン注	抗がん剤です	数分	💉																					💉
エンドキサン注	抗がん剤です	2時間	💉																					💉
プレドニゾン錠	ステロイドです	朝 内服	☯	☯	☯	☯	☯																	☯

1回5錠

尿が赤くなることがあります。

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗い・うがいを心がけましょう。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

:注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状																						
	食欲不振・吐き気																						
	不眠																						
	胃部不快感																						
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																						
	口内炎																						
	便秘																						
	発熱																						
	手足のしびれ																						
検査値	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
血小板減少																							

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。