



**【G-CVP療法について】**  
**(ガザイバ+エンドキサン+オンコビン+プレドニゾロン)**



様

□

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
レスタミン錠	アレルギー様症状を抑える	1日1回 内服	1回5錠	●																					●
ガザイバ注	抗がん剤です	3~6時間		●																					●
グラニセトン注	吐き気止めです	30分		●																					●
オンコビン注	抗がん剤です	数分		●																					●
エンドキサン注	抗がん剤です	2時間		●																					●
プレドニゾロン錠	ステロイドです	朝 内服		●	●	●	●	●																	●

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗い・うがいを心がけましょう。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

☺ **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状																							
	食欲不振・吐き気																							
	不眠																							
	胃部不快感																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	便秘																							
	発熱																							
	手足のしびれ																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。