



【Isa+d療法について】
(サークリサ+デキサート)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			カロナール錠	アレルギー予防	1日1回 内服	☯							☯							☯							☯					
デキサート注	抗がん剤です (ステロイド)	30分																														
ファモチジン注 ポララミン注	アレルギー予防		☯								☯							☯							☯							
サークリサ注	抗がん剤です	3-4時間	☯																													

*2コース目以降は2週間毎の投与になります。

*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください。

😊 **治療による副作用**

■ : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
自覚症状	アレルギー様症状	■							■								■							■								■
	食欲不振・吐き気	■	■	■					■	■	■						■	■	■					■	■	■						
	下痢		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
検査値	白血球減少								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	赤血球減少(貧血)								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	血小板減少								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。