



【R-THP-COP療法について】
(リツキサン+テラルビシン+エンドキサン+オンコピン+プレドニゾン)

様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
薬の名前	作用																								
レスタミン錠	アレルギー様症状を抑える薬です	1日1回 内服	☯️																						☯️
リツキサン注	抗がん剤です	3~6時間	💉																						💉
グラニセトン注	吐き気止めです	30分	💉																						💉
テラルビシン注	抗がん剤です	数分	💉																						💉
オンコピン注	抗がん剤です	数分	💉																						💉
エンドキサン注	抗がん剤です	30分	💉																						💉
プレドニゾン錠	ステロイドです	内服	💉	☯️	☯️	☯️	☯️	☯️																	💉

1回5錠

尿が赤くなることがあります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状																							
	食欲不振・吐き気																							
	不眠																							
	胃部不快感																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	便秘																							
	手足のしびれ																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。