



【R2療法について】
（レプラミド+リツキシマブ）



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール**（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																												1日目
レスタミン錠	アレルギー様症状を抑える薬です	1日1回 内服	○																												○
カロナー錠		1日1回 内服	○																												○
リツキシマブ注	抗がん剤です	2~4時間	📄																												📄
レプラミドカプセル	抗がん剤です	1日1回 内服	📄																												📄

*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください。

1回 カプセル

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

			1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																												1日目
自覚症状	アレルギー様症状	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。	■																												■
	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。	■																												■
	下痢	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出るときはお知らせ下さい。	■																												■
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがい心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。	■																												■
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。	■																												■
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。	■																												■
	腎機能低下	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。	■																												■
	肝機能低下	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。	■																												■

以下の副作用は、気づいたことがあればお知らせください。

- 血栓・塞栓（足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど）
- 皮膚障害（発疹、かゆみなど）



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 抗がん剤投与および投与後一定期間は適切な避妊を行ってください。
- * 自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

広島市民病院薬剤部