



【ガザイバ+カルケンス療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
薬の名前	作用	めやすの時間																													
レスタミン錠	アレルギー様症状を抑える薬です	1日1回内服	○	○						○							○														○
カロナール		1日1回内服	○	○						○							○														○
ソル・メドロール注	アレルギー様症状を抑える薬です	30分	□	□						□							□														□
ガザイバ注		2-4時間	□	□						□							□														□
カルケンス	抗がん剤です	1日2回内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

☆1コース目は、カルケンスのみ内服開始し、ガザイバは2コース目より投与開始となります。

*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障のある方はお知らせください。

☆3コース目以降、ガザイバの投与は4週に1回の投与になります。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																														
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																													
下痢																															
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出る場合はお知らせ下さい。																													
検査値	白血球減少																														
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを中心しましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																														
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																													
血小板減少																															
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																													
肝機能低下																															
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																													

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 出血(挫傷、鼻血等) ●不整脈(動悸、胸の痛み、めまい、ふらつき等) ●虚血性心疾患(息切れ、頭痛、意識消失等)
- 間質性肺炎(発熱、空咳、息苦しさ)



- *注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- *上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- *それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- *抗がん剤投与および投与後一定期間は適切な避妊を行ってください。
- *自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。
- *何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

広島市民病院薬剤部