



## 【ガザイバ+カルケンス療法について】



樣



## コース目



\*前立腺肥大症や閉塞隅角縁内障のある方はお知らせください。



### 注意が必要な時期

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 出血(挫傷、鼻血等)
  - 不整脈(動悸、胸の痛み、めまい、ふらつき等)
  - 虚血性心疾患(息切れ、頭痛、意識消失等)
  - 間質性肺炎(発熱、空咳、息苦しさ)



- \* **注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。**
  - \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
  - \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
  - \* 抗がん剤投与および投与後一定期間は適切な避妊を行ってください。
  - \* 自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。
  - \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

## 広島市民病院薬剤部