【リツキシマブ＋イムブルビカ療法について】

＊1コース28日毎として、1コース目、5コース目にリツキシマブを毎週点滴します

様　　コース目

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
レスタミン 錠	アレルギー予防です	1日1回　内服	💊							💊							💊							💊							
リツキシマブ注	抗がん剤です	3～6時間	💉							💉							💉							💉							
イムブルビカカプセル	抗がん剤です	1日1回　内服	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊	💊

1回　カプセル

*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障のある方はお知らせください。

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																													
	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																													
	下痢																													
	便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																													
検査値	白血球減少																													
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																													
	貧血の症状（めまい・ふらつき）がでたりします。転倒に注意しましょう。																													
	血小板減少																													
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																													
	肝機能低下																													
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなることがあります。																													

＊注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
＊上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
＊それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
＊何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。
＊自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。

広島市民病院薬剤部