



【シスプラチン+アリムタ療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			フォリアミン	葉酸を含む総合ビタミンです	1日1回 内服	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
イメンド	吐き気止めです	1日1回 内服	💊	💊	💊																			💧
アロキシ注 デカドロン注	吐き気止めです	30分	💧																					💧
デカドロン錠	吐き気止めです	朝 内服		📄	📄	📄																		💧
アリムタ注	抗がん剤です	10分	💧																					💧
シスプラチン注	抗がん剤です	2時間	💧																					💧

※ アリムタ注による副作用軽減のため、フォリアミン末(葉酸の粉薬)の内服、メチコパール(ビタミンB12)の注射を行います。

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気	■	■	■	■																			■
	皮疹			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							■
	手足のしびれ																							■
検査値	白血球減少																							■
	赤血球減少(貧血)																							■
	血小板減少																							■
	腎機能低下																							■
	肝機能低下																							■



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。