



【イミフィンジ+カルボプラチン+ペメトレキセド療法について】



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
薬の名前	作用																							
パンプタン	葉酸です	1日1回 内服																						
アプレピタントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																						
グラニセトロン注	吐き気止めです	15分																						
デキサート注																								
イミフィンジ注	抗がん剤です	1時間										この週はお休みです。							この週はお休みです。					
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分																						
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間																						

※ ペメトレキセド注による副作用軽減のため、パンプタン末(葉酸の粉薬)の内服、メチコパール(ビタミンB12)の注射を行います。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
	皮膚疹																						
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																						
	手足のしびれ																						
検査値	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						
	腎機能低下																						
	肝機能低下																						

* イミフィンジの副作用につきましては別紙を用いてご説明します。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使用することもあります。
- * 抗がん剤投与および投与後一定期間は適切な避妊を行ってください。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

広島市民病院薬剤部