



【イムデトラ療法について】



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
薬の名前	作用	めやすの時間																													
デキサート注	アレルギー予防の薬です	15分																													
イムデトラ注	抗がん剤です	1時間																													



この週はお休みです。

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	食欲不振・吐き気																														
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																													
	サイトカイン放出症候群																														
		発熱、倦怠感、吐き気、脱力感、めまい、ふらつき、呼吸が苦しいなどの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合はすぐにお知らせください。																													
検査値	神経学的事象																														
		力が入らない、言葉が出ない、ふるえ、けいれん、ねむけ、意識低下などの症状があらわれることがあります。																													
	味覚異常																														
		味やにおいの感じ方が変わり、食欲や食事が低下することがあります。																													
	白血球減少																														
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいをおこなってください。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																														
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																													
	血小板減少																														
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																													
	肝機能低下																														
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																													

間質性肺炎



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 抗がん剤投与および投与後一定期間は適切な避妊を行ってください。
- * 自動車の運転など、危険を伴う機械を操作する際は十分注意してください。

広島市民病院薬剤部