



【キイトルーダ+ゲムシタビン+シスプラチン療法について】



様

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
デキサート注	吐き気止めです	15分	☺													☺															☺
キイトルーダ注	抗がん剤です	30分	☺																												☺
ゲムシタビン注	抗がん剤です	30分	☺																												☺
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	☺																												☺
ソルデム3A注	水分の点滴です	60分	☺																												☺

腎臓を保護するため、たくさんのお水を点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻りに尿を出しましょう。

この週はお休みです。

*キイトルーダ注の副作用については別紙を用いてご説明します

☺ 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目								
自覚症状	発熱																														
	食欲不振・吐き気																														
	血管痛・静脈炎																														
	口内炎																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
	手足のしびれ																														
検査値	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														
	腎機能低下																														
	肝機能低下																														



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。
- * 自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。