



【S-1・CDDP・Her療法について】 (S-1+シスプラチン+ハーセプチン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	日																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハーセプチン注	抗がん剤です	90分	📄 2回目から投与時間が短くなる場合があります。																				
S-1	抗がん剤です	朝・夕 内服	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄						
イモドカプセル	吐き気止めです	1日1回	📄	📄	📄																		
アロキシ注 デキサート注	吐き気止めです	15分	📄	🗨️ 1回錠																			
デカロン錠	吐き気止めです	朝 内服		📄	📄																		
シスプラチン注	抗がん剤です	1時間	📄	🗨️ 腎臓を保護するため、この他に輸液を1本点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。																			

1日目
📄
📄
📄
📄

🗨️ この週はお休みです。

😊 治療による副作用

:注意が必要な時期

	日																				
	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状	注意が必要な時期																				
食欲不振・吐き気	📄 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																				
皮疹	📄 皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。																				
下痢	📄 便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																				
口内炎	📄 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																				
色素沈着	📄 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																				
手足のしびれ	📄 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																				
脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)	📄 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																				
検査値	注意が必要な時期																				
白血球減少	📄 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																				
赤血球減少(貧血)	📄 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																				
血小板減少	📄 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																				
腎機能低下	📄 顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																				
肝機能低下	📄 体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																				

1日目

📄 心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

