



【ビロイ+XELOX療法について】
(ビロイ+ゼローダ+エルプラット)



様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
			アロカリス注																						
パロノセトロン注	吐き気止めです	30分																							
デキサート注	過敏症を																								
ファモチジン注	抑えるお薬です																								
ボラミン注																									
デカドロン錠	吐き気止めです	1日1回内服																							
ビロイ注	抗がん剤です	2時間以上																							
エルプラット注	抗がん剤です	2時間																							
ゼローダ錠	抗がん剤です	朝・夕 内服																							

*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください。

😊 **治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
自覚症状	過敏症																								
	食欲不振・吐き気																								
	手足のしびれ																								
	血管痛																								
	口内炎																								
	下痢																								
	手足症候群																								
	色素沈着																								
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
検査値	白血球減少																								
	赤血球減少(貧血)																								
	血小板減少																								
	肝機能低下																								



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。
- * 自動車運転を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。