



# 【キイトルーダ+パドセブ療法について】



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
デキサート注	吐き気止めです	15分	☒												☒															☒
パドセブ注	抗がん剤です	30分	☒												☒															☒
生理食塩液		30分	☒																											☒
キイトルーダ注	抗がん剤です	30分	☒																											☒

2回目から投与時間が短くなります。

この週はお休みです。

\*キイトルーダ注の副作用については別紙を用いてご説明します

## 😊 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
自覚症状	皮疹																								
	手足のしびれ																								
	倦怠感																								
	食欲不振・吐き気																								
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
検査値	白血球減少																								
	赤血球減少(貧血)																								
	血小板減少																								
	腎機能低下																								

皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。

手足のしびれ、感覚が鈍などの症状が出ることがあります。

疲れ、脱力感などを感じたときは無理をせず、体を休めてください。

食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。

髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。

感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。

貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。

出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。

顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。

\* 血糖が上昇することがあります \* ドライアイなど、目に異常を感じるがあります。



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

